

لیتو خوارزمی ولوتیل®

محلول خوراکی استامینوفن

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: ضد درد

درمان درد و تب خفیف تا متوسط:

کودکان زیر ۱۲ سال: ۱۵-۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، هر ۶-۴ ساعت، بیش از ۵ دوز در روز مصرف نشود.

کودکان ۱۲-۱۷ سال: ۶۵۰ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت، حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳/۲۵ گرم، بزرگسالان: ۱-۵/۰ گرم هر ۶-۴ ساعت، حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴ گرم.

موارد منع مصرف:

حساسیت به استامینوفن یا هر یک از اجزا دارو بیماری شدید فعال کبدی

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

زیر نظر پزشک معالج می تواند مصرف شود.

هشدارها:

این دارو، همراه داروهای دیگر حاوی استامینوفن مصرف نشود.

اگر در حین درمان با دارو، کبودی، گلو درد یا سایر علائم عفونت را مشاهده کردید، مصرف دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

احتیاط های مصرف:

در افراد با اختلال عملکرد کبدی و کلیوی، مصرف کنندگان الکل، افراد با سو، تغذیه مزمن و افراد با کمبود آب بدن با احتیاط مصرف شود.

در بیماران با کمبود آنزیم G6PD با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی:

وارفارین، کاربامازپین، فتوباربتال، فنی تونین، کتوکوناژول، کلستیرامین، زیدوودین، متوکلوپرامید.

عوارض جانبی:

واکنش های پوستی، سندرم استیونس - جانسون، اختلالات خونی، لوکوپنی، آگرانولوسیتوز، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، سمیت کبدی، نارسایی کبدی (در دوز بالا).

تاریخ آخرین بازرینی و تدوین:

اردیبهشت ۱۳۹۸

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰

ATW.149/LF.01/P