

از رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری نمایید.

۸- تداخلات دارویی:

قبل از شروع درمان پزشک خود را در صورت مصرف داروهای ذیل مطلع سازید: الکلی، آمپودارون، آنتی هیستامین ها، لپریمازین، کلوزاپین، هالوپریدول، الازاپین، کوئتین، رسیپریدون
با کلوپن، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (آمی تریپتیلین، کلومیپرامین)، ایماتینیب، لاموتریزین، اوپرومیسین

۹- عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

مهمترین این عوارض عبارتند از: اضطراب، گیجی (به ویژه در سالخوردهگان)، ضربان تند و نامنظم قلب، افسردگی روانی، توهم، خواب آلودگی، ضعف عضلانی، حرکات غیر قابل کنترل بدن از جمله چشم ها، اشکال در به خواب رفتن، کبودی و خونریزی عادی، بثورات جلدی، زخم در دهان یا در گلو.

۱۰- شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی ایمن آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۳۹۸

کلونازپام ۱ و ۲، قرص های خوراکی خط دار متقاع هستند که حاوی ۱ و ۲ میلی گرم کلونازپام می باشند که توسط شرکت داروسازی خوارزمی به بازار عرضه می شود.

۱- راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمائید:

وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی

- استفاده از سایر داروها - ابتلا به بیماری های دیگر

- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص کلونازپام ۱ و ۲ بسته به شرایط بیماری و بیمار تجویز می گردد

و تجویز آن دو روز کم شروع و در صورت نیاز توسط پزشک معالج افزایش می یابد.

مقدار مصرف عمومی:

ضد تشنج:

- بزرگسالان: ۱ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۴ شب، دوز طی ۳-۴ هفته قابل افزایش می باشد، حداکثر مقدار مصرف دارو ۸-۴ میلی گرم در روز است.

خوارزمی و کودکان: مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.

ضد اضطراب:

- بزرگسالان: ۲-۱ میلی گرم روزانه

۳- نحوه مصرف:

نحوه درمان را کامل کنید و دارو را راس ساعت به همراه یک لیوان آب میل نمائید.

از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمائید.
در صورت فراموشی یک نوبت دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمائید و در صورت گذشتن بیش از ۱ ساعت از زمان مقرر، از مصرف نوبت فراموش شده خودداری نمائید و دوز بعدی را در زمان مقرر مصرف کنید.

- از آنجایی که این دارو سبب ایجاد وابستگی می شود، لذا از مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده و یا مدت زمان توصیه شده توسط پزشک خودداری نمائید.

۴- موارد منع مصرف:

- کما

- دیسپن تنفسی

- اعتیاد به الکل و مواد مخدر

۵- مصرف به بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی در این دوران توصیه نمی شود و مصرف آن تنها تحت نظر پزشک معالج امکان پذیر می باشد.

۶- هشدارها:

از مصرف در یورفیری حاد، انسداد مسیر تنفسی، آسیب مغزی - نخاعی، افسردگی، افکار با سابقه اقدام به خودکشی خودداری شود.

۷- موارد احتیاط:

مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان با این دارو



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پست دروازه خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۱۱۱۷ کدپستی: ۱۳۹۱۷۱۵۴۱
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com