



محصول قرص روکشدار خط دار آتورواستاتین ۲۰ میلی گرم و آتورواستاتین ۴۰ میلی گرم در پلیسترهای ۱۰ عددی به همراه برگه راهنمای مصرف توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده، لذا از مصرف دارو در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید. در صورتی که سوال یا نکته مهمی در مورد مصرف دارو به نظرتان رسید، با پزشک یا داروساز مشورت فرمایید.

مادر مصرف:

آتورواستاتین در درمان چربی خون و کلسترول بالا به کار می رود. این دارو همچنین در افرادی که ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی را دارند به عنوان درمان پیشگیرانه به کار می رود. برای مثال در بیماران دیابتی حتی در صورت نرمال بودن میزان چربی خون تجویز می شود

مقدار و نحوه تجویز:

دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نماید و در صورت فراموشی نحوه مصرف، از پزشک یا داروساز خود کمک بخواهد.

در طول مصرف این دارو از رژیم غذایی کم چرب پیروی فرمایید.

دوز شروع معمول این دارو ۱۰-۲۰ میلی گرم یک بار در روز می باشد. در بیماران که کاهش شدید LDL - کلسترول مدنظر باشد، ممکن است دوز اولیه ۴۰ میلی گرم تجویز گردد. دوز دارو بر اساس تشخیص پزشک در فواصل ۴ هفته ای تنظیم می گردد و تا ۸۰ میلی گرم روزانه در بزرگسالان بالا

می رود. در کودکان ۱-۷ ساله حداکثر دوز روزانه ۲۰ میلی گرم می باشد. قرص آتورواستاتین به شکل کامل همراه آب میل شود. این قرص در هر ساعت از شبانه روز، همراه غذا و یا بدون آن می تواند مصرف شود. بهتر است همواره دارو را در ساعت معین میل کنید.

در صورت فراموشی یک دوز از دارو، از دوبرابر نمودن دوز بعدی خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

این دارو در نوزادان مانند سایر مواد دارویی به موانع اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود؛ البته همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. عوارض شایع این دارو شامل موارد زیر می باشد:

عوارض پوستی مانند راش و بثورات جدی، عوارض گوارشی مانند اسهال، یبوست، تهوع، تجمع گاز در معده و سوزش معده، عوارض مربوط به سیستم اعصاب مرکزی مانند سردرد، بی خوابی و سرگیجه، از دیگر عوارض دارو می توان به تغییر در تستها کبدی و افزایش سطح قند خون اشاره نمود. (در صورت ابتلا به دیابت با پزشک خود مشورت نمایید). عوارض نادر دارو شامل: عوارض شدید پوستی، عوارض چشمی، کاهش توان جنسی، اختلالات خواب، اختلال در شنوایی، بویایی و چشایی، عوارض تنفسی

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به آتورواستاتین یا مصرف این دارو خودداری نمایید.

بارداری و شیردهی

اختلال جاد کبدی

شرایط نگهداری و تاریخ انقضا:

دارو در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

عمر فقهی اید این شرایط ۳ سال پس از تاریخ تولید است.

از مصرف داروهای تاریخ مصرف گذشته خودداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ATW.010/LF.0

شکل دارویی:

فراورده خوراکی به شکل قرص.

هشدارها:

در صورت وابسته و کاهش حساسیتی به آتورواستاتین، از مصرف دارو خودداری نمایید.

هرگونه در عضلات، حساسیت یا کشیدگی عضلانی یا ضعف در عضلات را فوراً به پزشک خود اطلاع دهید خصوصاً در مواردی که همراه با تب و بی حالی تا متعاف باشد.

این دارو ممکن است سبب حساسیت به نور گردد. لذا در زمان مصرف این دارو از ضد آفتاب، کلاه و عینک آفتابی استفاده نمایید.

در صورت وقوع حاملگی در حین مصرف این دارو، بلافاصله دارو را قطع نموده به پزشک خود اطلاع دهید.

رژیم، ورزش و کاهش وزن در بیماران مبتلا به چاقی توصیه می شود.

در ابتدای درمان و در فواصل معین توصیه می شود آزمون های کبدی و سنتش پزشک خود اطلاع دهید.

از مصرف بیش از حد آب گریب فرود در زمان مصرف این دارو خودداری نمایید.

از مصرف الکل خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف آتورواستاتین در بارداری و شیردهی ممنوع می باشد. در حین مصرف دارو از روش های مطمئن ضد بارداری استفاده نمایید.

تداخلات دارویی:

مصرف آتورواستاتین با برخی آنتی بیوتیک ها و ضد قارچ ها تداخل دارد مانند اریترومايسين، کلاریترومایسین، کتوکونازول، ایتراکونازول، فلوکونازول، ریفاکسیم، فوسیدیک اسید.

فیبرات ها مانند جی فایبروزیل

آلمودیپین و دیلتیازم

دیگوکسین، واریپالام، آمیودارون

داروهای که در درمان ایذ به کار می روند مانند ریتوناویر، ایندیناویر، داروناویر و ترکیبات آن ها

داروایی که در درمان هیپرتن به کار می روند مانند تالپروریر

از تیئیمپ، وارفارین، ضدبارداری های خوراکی، ساینیدین، کلشسی سین، آنتی اسیدهای گوارشی در بسیاری از تداخلات بالا، دور دارو توسط پزشک معالج یا داروساز شما تنظیم می گردد. لذا در صورت مصرف هرگونه داروی گیاهی و یا شیمیایی پزشک یا داروساز خود را مطلع فرمایید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزد. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر ۱۴۰۲